



顔面部位評価法

点

No. _____

安静時非対称		鼻翼を動かす	
左右対称	4	左右対称	4
緊張は見られるが、左右差あり	2	少し動く	2
緊張なし、眉毛と口角が健側より下垂する	0	不動	0
額のしわ寄せ		頬をふくらます	
左右対称	4	左右対称・息がもれない	4
しわの左右差(数と深さ)	3	わずかな左右差・息が少しもれる	3
しわがよる	2	頬の膨隆はあるが、息がもれる	2
眉毛部が動く	1	頬の膨隆なく、息もれのみ	0
不動	0		
軽い閉眼		イーと歯を見せる	
左右対称	4	左右対称	4
まつげのわずかな左右差があるが、兎眼はない	3	わずかな左右差	3
まぶたが動くが兎眼がある持続的な閉眼	2	口角が麻痺側に動く	2
まぶたが(かすか)に動く一瞬閉眼するが持続しない	1	口角が固定しているが、緊張は見られる	1
まぶた不動	0	麻痺側の口角が健側に偏位する	0
強い閉眼		口笛	
左右対称	4	左右対称	4
軽度の閉眼時より閉じるが左右差あり	2	口角、口唇が動く	2
軽度閉眼時と不変	0	上下の口唇が開大してします、口角は不動	0
片目つぶり		口をへの字に曲げる	
左右差なし	4	左右対称	4
出来るが兎眼あり	2	口角の下制がみられ、広頸筋の緊張あり	2
不可	0	口角不動で広頸筋の緊張がみられない	0

38点以上は正常、8点以下は完全麻痺とする。